

なす台風対策②

J Aはが野
営農部 営農指導

◎病害対策

- ・強風により樹はかなり傷んでおります。病気の発生を軽減するためにも殺菌剤の散布を行いましょう。

効果	病害名	農薬名	使用時期	使用回数	使用倍率
予防・治療	灰色かび病・菌核病・うどんこ病	シグナムWDG	前日	3回	1500倍
予防・治療	灰色かび病・菌核病・黒枯病・【すすかび病】	ファンタジスタ顆粒水和剤	前日	3回	2000～3000倍 【2000倍】
予防	灰色かび病・すすかび病・うどんこ病・菌核病	アフエットフロアブル	前日	3回	2000倍
予防 初期治療	褐色腐敗病	レーバスフロアブル	前日	3回	2000倍
予防 初期治療	褐色腐敗病	ランマンフロアブル	前日	4回	2000倍

☆圃場が過湿気味であればルートパワー（10a／10kg、100倍以上で灌注）やネハリエース（10a／20kg）も有効です。

※農薬を使用する前にはラベルを確認し、使用基準を遵守しましょう。水和剤は実に汚れが出る場合がございます。展着剤を使用するようにしましょう。

◆上記農薬以外についても在庫状況をご確認いただき、在庫があるようでしたらそちらをお使いください。

終盤に差し掛かかっての台風の直撃となり、大変ご苦労されることと思いますが、販売、地区担当、指導一丸となり部会目標達成に向けて最後まで販売してまいります。皆様におかれましても健康に留意しつつ、1本でも多くご出荷対応いたします様、ご協力のほどお願い申し上げます。

台風通過中は絶対圃場には出ず、外の安全が確保されましたら管理、復旧作業をお願い致します。