

なす台風対策

J Aはが野 営農指導

はが野管内にてお盆のころ台風通過が予測され、大雨や強風等の影響が出ることが予想されます。
通過前・通過後の対策をしっかりと行い、草勢の回復に努めましょう。

①状況の確認

○防風ネット、V時支柱の点検、マイカー線の状態を確認すること。

切れていたり、破損のあった場合には速やかに補修を行うこと。

○風雨による傷果は摘果し、著しく損傷した葉も摘葉する。樹勢回復と病気予防対策を行う。

しっかり支柱にとめる
 こと。被害が軽減でき
 ます。

②排水対策

◆ ↓ ほ場が過湿になった時の有効な資材 ↓ 水が溜まった圃場は速やかに排水に努める！！

(1) はが野ルートパワーα液剤：100倍液を10a当り200~300L葉面散布する。又は、10a当り10kgを100倍液以上に希釈し灌注する。

(2) グリーンセーフS：10a当り1ℓ、1500~2000倍を灌注、葉面散布は800~1000倍で。

(3) ネハリエース粒剤：畝間や株もとに10a当り20kg撒粒する。

③台風通過後は草勢回復に努めましょう！ 葉面散布+殺菌剤散布

葉面散布：メリット青 500倍、メリット黄 500倍 または 葉友 1000倍

(↑ 窒素成分中心の葉面散布剤を使用する。 ↑)

殺菌剤散布：損傷した部位からの病気の侵入を防ぐためにも、

殺菌剤を散布しましょう。

窒素が入っている資材が
 有効です。

薬剤散布については日中は
 避け、天候や気温を確認し、
 早朝・夕方に行いましょう。



汚れ注意

効果	病害名	農薬名	使用時期	使用回数	使用倍率
予防・治療	灰色かび病・菌核病・うどんこ病	シグナムWDG	前日	3回	1500倍
予防・治療	灰色かび病・菌核病	ゲッター水和剤	前日	5回	1000~1500倍
予防	灰色かび病・すすかび病・うどんこ病・菌核病	アフェットフロアブル	前日	3回	2000倍
予防	灰色かび病	セイビアーフロアブル20	前日	3回	1000~1500倍
予防・初期治療	褐色腐敗病	レーバスフロアブル	前日	3回	2000倍
予防・初期治療	褐色腐敗病	ランマンフロアブル	前日	4回	2000倍
予防・治療	褐色腐敗病	フォリオゴールド	前日	3回	800~1000倍

◆灰色かび病、褐色腐敗病に登録のある主な薬剤（R1.6.12.現在）

※ 農薬を使用する前にはラベルを確認し、使用基準を遵守しましょう。**水和剤は実に汚れが出る場合**がございます。

◆上記農薬以外についても在庫状況をご確認いただき、在庫があるようでしたらそちらをお使いください。

台風通過に伴う梨の対策について

令和4年8月12日
JAはが野営農指導

事前対策

- ・多目的防災網の破れを確認し補修する。風当たりの強い園地は、必要に応じて、防風ネットを周囲に巻き、補強する。
- ・水田転換畑は、冠水しやすいため、明きょ排水等を行う。
- ・収穫が始まっている場合は、台風接近前（風が強まる前）にできるだけ成熟果を収穫しておく。
- ・収穫した果実の一時保管は、清潔なコンテナに入れてシートを被せ、冷涼な室内（納屋等）へ置いておく。

事後対策

- ・台風に伴う擦れ果、裂皮が増えるおそれがあるため、出荷に際しては選果選別を徹底する。台風通過後、成熟が進んだ場合に収穫が遅れないよう注意する。
- ・園内が冠水した場合は、速やかに明きょ等の排水対策を講じる。
- ・台風通過後、枝葉等がひどく損傷した場合は、直ちに殺菌剤を追加で散布する（園地の地面が緩んでいることに注意）。
- ・多目的防災網が破損した場合は、できるだけ早く補修する。