

なす台風対策

J Aはが野 営農指導

8月に入りなすの収穫が最盛期を迎えていますが、台風6号に続き台風7号が発生し被害が出る恐れがあります。前もって対策を行うことで被害が最小限に抑えられますので天気予報をご確認の上作業管理お願い致します。

①状況の確認

- 防風ネット、V時支柱の点検、マイカー線の状態を確認すること。
切れていたり、破損のあった場合には速やかに補修を行うこと。
- 風雨による傷果は摘果し、著しく損傷した葉も摘葉する。
樹勢回復と病気予防対策を行う。

②排水対策

◆ 水が溜まった圃場は速やかに排水に努める！！

- (1) はが野ルートパワーα液剤：100倍液を10a当り200～300L 葉面散布する。
又は、10a当り10kgを100倍液以上に希釈し灌注する。
- (2) グリーンセーフS：10a当り1ℓ、1500～2000倍を灌注
葉面散布は800～1000倍で。
- (3) ネハリエース粒剤：畝間や株もとに10a当り20kg撒粒する。

③台風通過後は草勢回復に努めましょう！ 葉面散布 + 殺菌剤散布

葉面散布

メリット青 500倍、メリット黄 500倍、葉友 1000倍

(上記いずれかの窒素成分中心の葉面散布剤を使用する。)

殺菌剤散布

損傷した部位からの病気の侵入を防ぐためにも、殺菌剤を散布しましょう。



薬剤散布については日中は避け、天候や気温を確認し、夕方に行いましょう。

◆台風後に有効な主な薬剤

※薬剤確認日 令和5年8月9日

効果	病害名	農薬名	使用時期	使用回数	使用倍率
予防 治療	灰色かび病・菌核病 うどんこ病	シグナムWDG	前日	3回	1500倍
予防 治療	灰色かび病・すすかび病 菌核病・うどんこ病	パレード20フロアブル	前日	3回	2000~4000倍
予防	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病・菌核病 等	アフェットフロアブル	前日	3回	2000倍
予防	灰色かび病	セイビアーフロアブル20	前日	3回	1000~1500倍
予防 初期治療	褐色腐敗病	レーバスフロアブル	前日	3回	2000倍
予防 初期治療	褐色腐敗病	ランマンフロアブル	前日	4回	2000倍
予防 治療	褐色腐敗病	フォリオゴールド	前日	3回	800~1000倍

※農薬を使用する前にはラベルを確認し、使用基準を遵守しましょう。

水和剤は実に汚れが出る場合がございます。

◆上記農薬以外についても在庫状況をご確認いただき、在庫があるようでしたらそちらをお使いください。