

なす大雨・強風の事前・事後対策

令和7(2025)年9月4日

J Aはが野営農指導・芳賀農業振興事務所

はが野管内において、9月3日に大雨や強風等が発生しました。また、台風15号の接近に伴い、今後、大雨や強風等の影響が懸念されることから、以下の対策を行い、早期の草勢回復及び被害の未然防止を図りましょう。

①事前対策

- 強風による損傷や倒伏を軽減するため、茎や枝を支柱やネット、誘引線によく固定しておく。また、大雨による冠水等が懸念されるので、排水路の点検を行い、浸水及び冠水時の速やかな排水に備える。
- 被害を軽減するため、収穫可能な果実は早めに収穫する。

②事後対策

- ◆ ↓ ほ場が過湿になった時の有効な資材 ↓ 水が溜まった圃場は速やかに排水に努める！！
- (1) はが野ルートパワーα液剤：100倍液を10a当り200～300L葉面散布する。又は、10a当り10kgを100倍液以上に希釈し灌注する。農薬との混用により凝集する場合があるので混用しない。
- (2) グリーンセーフS：10a当り1ℓ、1500～2000倍を灌注、葉面散布は800～1000倍で。
- (3) ネハリエース粒剤：畝間や株もとに10a当り20kg撒粒する。

③早めの草勢回復に努めましょう！（事後対策）葉面散布＋殺菌剤散布

薬剤散布について、日中は避け、天候や気温を確認し、早朝・夕方に行いましょう。

葉面散布：メリット青 500倍 または 葉友 1000倍

(↑ 窒素成分主体の葉面散布剤を使用する。 ↑)

殺菌剤散布：損傷した部位からの病気の侵入を防ぐためにも、
殺菌剤を散布しましょう。

効果	病害名	農薬名	使用時期	使用回数	使用倍率
予防・治療	灰色かび病・菌核病・うどんこ病	シグナムWDG	前日	3回	1500倍
予防・治療	灰色かび病・すすかび病・うどんこ病・菌核病	パレード20フロアブル	前日	3回	2000～4000倍
予防・治療	灰色かび病・すすかび病・うどんこ病・菌核病	アフェットフロアブル	前日	3回	2000倍
予防・治療	うどんこ病・灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	前日	2回	2000倍
予防・初期治療	褐色腐敗病	レーバスフロアブル	前日	3回	2000倍
予防・初期治療	褐色腐敗病	ランマンフロアブル	前日	4回	2000倍
予防・治療	褐色腐敗病	ホライズンドライフフロアブル	前日	3回	2500倍

◆灰色かび病、褐色腐敗病に登録のある主な薬剤（R7/9/4現在）
※ 農薬を使用する前にはラベルを確認し、使用基準を遵守しましょう。**水和剤は実に汚れが出る場合**がございます。
◆上記農薬以外についても在庫状況をご確認いただき、在庫があるようでしたらそちらをお使いください。